FMC An Agricultural Sciences Company

Irazu®

Insekticid

Powered by Cyazypyr® active

NOVINKA

NOVÉ ŘEŠENÍ DŘEPČÍKA OLEJKOVÉHO

SÍLA VULKÁNU PROTI ŠKŮDCŮM ŘEPKY OLEJKY

CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU

ÚČINNÁ LÁTKA	Cyazypyr® 100 g/l (IRAC 28)
FORMULACE	suspo emulze (SE)
RIZIKO PRO VČELY	ZNV (přípravek nesmí být aplikován na porost navštěvovaný včelami)
OP II. ST. ZDROJŮ PODZEMNÍ VODY	vyloučen
OP II. ST. ZDROJŮ POVRCHOVÉ VODY	vyloučen
POČET APLIKACÍ	v řepce olejce max. jednou za 3 roky na stejném pozemku
BALENÍ	5 l

VLASTNOSTI A VÝHODY PŘÍPRAVKU

- Nový insekticid s novou účinnou látkou k ochraně řepky
- Bez křížové rezistence s účinnými látkami z jiných skupin
- Řešení škůdců řepky rezistentních k pyretroidům
- Translaminární a lokálně systémová distribuce účinné látky v listech a stoncích ošetřených rostlin
- Požerové a kontaktní působení
- Rychlý nástup účinku, zastavení žíru, následný úhyn
- Hubení dospělců a larev dřepčíka olejkového
- Aplikace doporučena na podzim na začátku líhnutí larev dřepčíka
- Nadstandardně dlouhá doba ochrany porostu
- Velmi dobrá účinnost pro maximální výnos
- Registrace i na stonkové krytonosce a blýskáčka
- Prodej samostatně i v balíčku Irazu® Plus

ROZSAH POUŽITÍ

PLODINA	ŠKODLIVÝ ORGANISMUS	DÁVKOVÁNÍ	OL	POZNÁMKA
řepka olejka ozimá	dřepčík olejkový	0,4 l/ha	AT	BBCH 10–19
řepka olejka	krytonosec čtyřzubý, krytonosec řepkový	0,75 l/ha	AT	BBCH 20–59
řepka olejka	blýskáček řepkový	1 l/ha	AT	BBCH 30–59

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

FMC Agro Česká republika spol. s r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, www.fmc.com

FMC An Agricultural Sciences Company

Irazu® Plus

Balíček insekticidů

NOVÉ ŘEŠENÍ OCHRANY ŘEPKY PROTI DŘEPČÍKOVI OLEJKOVÉMU

SLOŽENÍ BALÍČKU: **Irazu® 1×5 l** + **Nuyard® 1×1 l**

* Nuyard® (deltamethrin 100 g/l)

NUYARD® PRO PRVNÍ APLIKACI CÍLENOU NA ŘEŠENÍ BROUKŮ PO NÁLETU DO POROSTU, IRAZU® PRO ZÁVĚREČNÉ OŠETŘENÍ PROTI LARVÁM DŘEPČÍKA, HUBÍ LARVY I DOSPĚLCE

DŘEPČÍK OLEJKOVÝ - DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

Irazu® hubí dospělce a larvy dřepčíka olejkového. **Základním předpokladem pro dosažení vysokého stupně ochrany porostu je správné načasování aplikace.** Samičky dřepčíka olejkového začínají klást vajíčka po období úživného žíru a páření. To je přibližně 2–3 týdny po náletu brouků do porostů řepky. **Pro dosažení nejlepší účinnosti je doporučeno přípravek aplikovat až na začátku líhnutí larev, tj. zpravidla během října, a to na základě monitoringu.**
Před touto aplikací, při prvním zjištění výskytu dospělců dřepčíka v Mörickeho miskách, resp. objevení požerků na rostlinách, je třeba provést ošetření přípravkem Nuyard®, nebo jiným vhodným pyretroidem. Zde je cílem ochrana porostu před poškozením žírem a redukce počtu jedinců schopných páření. Zároveň jsou hubeni také dřepčíci rodu *Phyllotreta*, kteří v této době obvykle škodí na listech vzešlé řepky.

Larva dřepčíka olejkového

Poškození řapíku listu larvami

BBCH	00	10	13	15	19
dřepčík olejkový / dospělci (nálet brouků do Mörickeho misek, resp. první požerky na listech)		**Nuyard® 62,5 ml/ha**			
dřepčík olejkový / larvy a dospělci (začátek líhnutí larev, zpravidla během října, aplikace na základě monitoringu)				**Irazu® 0,4 l/ha**	